

## 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただ  
きたくご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### 記

- 実施日

平成 29 年 7 月 6 日 (木) 受託分より変更

- 変更項目および変更内容

詳細につきましては次ページ以降の内容をご参照願います。

平成 29 年 7 月 6 日 (木) 受託分より変更

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
1106	イトサクシト <sup>®</sup>	項目名称	イトサクシト <sup>®</sup>	イトサクシト <sup>®</sup>
1109	アセタゾールアミト <sup>®</sup>	項目名称	アセタゾラミト <sup>®</sup>	アセタゾールアミト <sup>®</sup>
1122	コハク酸シハ <sup>®</sup> ソゾリン	項目名称	シハ <sup>®</sup> ソゾリン	コハク酸シハ <sup>®</sup> ソゾリン
1134	ゲンタマイシン	基準値 (単位)	Peak 15~20 Trough 1未満 μg/ml	Peak 4.0~10.0 Trough 2.0以下 μg/ml
		採血時間	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク)投与前30分以内(トラフ)	筋注後 15~60分 点滴静注終了後(ピーク) 次回投与直前(トラフ)
1135	アミカシ	基準値 (単位)	Peak 50~60 Trough 4未満 μg/ml	Peak 2.0~30.0 Trough 8.0以下 μg/ml
		採血時間	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク)投与前30分以内(トラフ)	静注投与後1時間(ピーク) 次回投与直前(トラフ)
1136	アルバカシ	基準値 (単位)	Peak 15~20 Trough 1~2未満 μg/ml	Peak 9~20 Trough 2未満 μg/ml
		採血時間	点滴開始1時間後(30分で投与した場合、終了30分後)(ピーク)投与前30分以内(トラフ)	点滴静注終了時(ピーク) 次回投与直前(トラフ)
1138	テイコ <sup>®</sup> ラニン	基準値 (単位)	Trough 15~30 μg/ml	Trough濃度 5~10 (メーカ参考値) μg/ml
		採血時間	投与前30分以内(トラフ)	次回投与前(トラフ)

外注先 保健科学

新基準値はグラム陰性菌感染症の重症時における標準治療の基準です (下表参照)。

グラム陰性菌感染症に対する標準治療における目標値(μg/ml)

最少発育阻止濃度 (MIC)	8μg/ml (重症)		≤4μg/ml (軽・中等度)	
アミカシ	50~60(ピーク)	4未満(トラフ)	41~49(ピーク)	4未満(トラフ)

最少発育阻止濃度 (MIC)	2μg/ml (重症)		≤1μg/ml (軽・中等度)	
ゲンタマイシン	15~20(ピーク)	1未満(トラフ)	8~10(ピーク)	1未満(トラフ)

抗菌薬TDMガイドライン2016より改変